

# CA TÁ LO GO

DIGITAL



# PETS



# ÍNDICE

LINHA DOR

ANTIMICROBIANOS

DERMATOLÓGICOS  
(HIDRATAÇÃO E ALERGIAS)

DERMATOLÓGICOS  
(INFECÇÕES)

DERMATOLÓGICOS  
(DISQUERATINIZAÇÃO  
E SEBORREIAS)

DERMATOLÓGICOS  
(OTOLÓGICOS)

GASTRO

ESPECIALIDADES

SUPLEMENTOS

DESINFETANTE

INJETÁVEIS

ANTIPARASITÁRIOS

EXCLUSIVO  
GATOS

LANÇAMENTOS

CRONIDOR®  
PÁG. 4

CARPROFLAN  
PÁG. 4

PREDNON®  
PÁG. 4

FLAMAVET®  
PÁG. 5

KETOJET®  
PÁG. 5

AGEMOXI® CL  
PÁG. 6

DOXITRAT®  
PÁG. 6

CEFTRAT®  
PÁG. 6

NORFLAGEN®  
PÁG. 7

ZELOTRIL®  
PÁG. 7

CLINBACTER®  
PÁG. 7

REVIPEL®  
POCKET  
PÁG. 8

DERMOGEN®  
XAMPU  
PÁG. 8

CORTISHAMP®  
PÁG. 8

HIDRAPET®  
CREME  
PÁG. 9

HIDRAPET®  
XAMPU  
PÁG. 9

HIDRAPET®  
SKIN ON  
PÁG. 9

CLORESTEN®  
PÁG. 10

SEPT CLEAN®  
PÁG. 10

SEBOTRAT® S  
PÁG. 10

SEBOTRAT® O  
PÁG. 10

DERMOGEN® OTO  
PÁG. 11

CLEAN-UP®  
PÁG. 11

OTOCALM®  
PÁG. 11

ZELOTRIL® OTO  
PÁG. 12

EMEDRON®  
COMPRIMIDOS  
PÁG. 12

GAVIZ® V  
PÁG. 12

SEC LAC®  
PÁG. 13

PETPRIL®  
PÁG. 13

REVIMAX®  
PÁG. 13

LACRI  
PÁG. 13

LACRI CAPS® PET  
PÁG. 14

OMEGA TOP® 3  
PÁG. 14

HIDRAPET®  
ÔMEGA  
PÁG. 14

PROCART®  
PÁG. 15

PROCART®  
FLEX  
PÁG. 15

MEGA  
MATER® PET  
PÁG. 15

HYSTERIL®  
PÁG. 16

CRONIDOR® 2%  
PÁG. 16

FLAMAVET® 0,2 %  
PÁG. 16

KETAMINA  
AGENER 10%  
PÁG. 17

EMEDRON® 1%  
PÁG. 17

PROVIDEAN®  
VIRATEC 10 CVL  
PÁG. 17

HELFIN® PLUS  
CÃES  
PÁG. 18

FENZOL PET®  
PÁG. 18

MECTIMAX®  
PÁG. 18

BALL FREE®  
PÁG. 19

MIRTZ®  
PÁG. 19

HELFIN® PLUS  
GATOS  
PÁG. 19

FLAMAVET® 0,2 MG  
GATOS  
PÁG. 19

ECTOCID®  
PÁG. 20

QPELO® PET®  
PÁG. 20

SEPT CLEAN® OTO  
PÁG. 20

PROVIDEAN  
VIRATEC® DP  
PÁG. 21

PROVIDEAN  
VIRATEC® 6 CVL  
PÁG. 21

## ANALGÉSICO OPIOIDE

# Cronidor®



Cloridrato de Tramadol

### INDICAÇÕES

Alívio da dor nos quadros agudos e crônicos e no protocolo pós-cirúrgico.

### APRESENTAÇÕES

**Cronidor® 12 mg / Cronidor® 40 mg / Cronidor® 80 mg** cartuchos com 10 comprimidos palatáveis e bissulcados.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e Gatos:** 2 mg / kg / VO / a cada 8 horas / até 4 dias ou a critério do Médico Veterinário.



VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO, COM RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DA NOTIFICAÇÃO DA RECEITA.

## ANTI-INFLAMATÓRIO

# Carproflan®



Carprofeno

### INDICAÇÕES

Anti-inflamatório não esteroideal COX-2 seletivo, analgésico e antitérmico para cães.

Efeito condroprotetor por meio da inibição da produção do fator ativador dos osteoclastos e do estímulo da produção dos glicosaminoglicanos articulares.

### APRESENTAÇÕES

**Carproflan 25 mg / Carproflan 75 mg / Carproflan 100 mg:** cartuchos com 14 comprimidos palatáveis e bissulcados.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

#### Cães

**Carproflan 25 mg:** 1 cp. / 10 kg / VO / a cada 12 horas ou 1 cp. / 6 kg / VO / a cada 24 horas / 14 dias ou a critério do Médico Veterinário.

**Carproflan 75 mg:** 1 cp. / 30 kg / VO / a cada 12 horas ou 1 cp. / 17 kg / VO / a cada 24 horas / 14 dias ou a critério do Médico Veterinário.

**Carproflan 100 mg:** 1 cp. / 40 kg / VO / a cada 12 horas ou 1 cp. / 22 kg / VO / a cada 24 horas / 14 dias ou a critério do Médico Veterinário.



# Prednon®



Prednisolona

### INDICAÇÃO

Anti-inflamatório esteroideal para cães.

### APRESENTAÇÃO

**Prednon® 4 mg/mL:** frasco com 30 mL + seringa dosadora - solução oral palatável.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães:** 0,5 a 1 mg / kg / VO / a cada 24 horas ou a critério do Médico Veterinário.

#### • DOSE •

ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDEAL PARA CÃES

CÃES: 0,5 a 1 mg / kg / VO / a cada 24 horas\*

0,5 mg / kg	1 mg / kg	PESO
0,1 mL	0,2 mL	0,8 kg
0,25 mL	0,5 mL	2 kg
0,5 mL	1 mL	4 kg
1 mL	2 mL	8 kg
1,25 mL	2,5 mL	10 kg
2,5 mL	5 mL	20 kg

\*ou sob orientação do Médico Veterinário



# Flamavet®

Meloxicam

## INDICAÇÕES

Anti-inflamatório não esteroide COX-2 seletivo e analgésico para cães e gatos.

## APRESENTAÇÕES

**Cães - Flamavet® 0,5 mg / Flamavet® 2 mg:** displays com 5 blísteres contendo 10 comprimidos palatáveis e bissulcados ou cartuchos com 10 comprimidos palatáveis e bissulcados.

**Gatos - Flamavet® 0,2 mg:** display com 5 blísteres contendo 10 comprimidos palatáveis e bissulcados ou cartuchos com 10 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães:** no primeiro dia 0,2 mg / kg / VO / a cada 24 horas; a partir do segundo dia 0,1 mg / kg / VO / a cada 24 horas / por até 35 dias ou a critério do Médico Veterinário.

**Gatos:** no primeiro dia 0,1 mg / kg / VO / a cada 24 horas; a partir do segundo dia 0,05 mg/kg / VO / a cada 24 horas / por até 21 dias ou a critério do Médico Veterinário.



# ketojet®

Cetoprofeno

## INDICAÇÕES

Anti-inflamatório, analgésico e antitérmico para cães e gatos.

## APRESENTAÇÕES

**Ketojet® 5 mg / Ketojet® 20 mg:** cartuchos com 10 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

Cães e gatos

**Ketojet® 5 mg:** 1 cp. / 5 kg / VO / a cada 24 horas / 3 a 5 dias ou a critério do Médico Veterinário.

**Ketojet® 20 mg:** 1 cp. / 20 kg / VO / a cada 24 horas / 3 a 5 dias ou a critério do Médico Veterinário.



dica



## Gaviz V® Omeprazol

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

Cães e gatos

**Gaviz® V 10 mg:** 1 cp. / 10 kg / VO / a cada 24 horas / 10 a 14 dias, ou a critério do Médico Veterinário.

**Gaviz® V 20 mg:** 1 cp. / 20 kg / VO / a cada 24 horas / 10 a 14 dias, ou a critério do Médico Veterinário.



Os protetores gástricos são muito prescritos na rotina clínica de cães e gatos com o objetivo de prevenir e tratar as desordens ulcerativas, que podem ser causadas pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais.

# Agemoxi CL<sup>®</sup>

Amoxicilina Tri-hidratada e Clavulanato de Potássio

## INDICAÇÕES

**Cães:** infecções causadas por cepas sensíveis de *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium*, *Fusobacterium nucleatum*, *Porphyromonas gulae*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius*, *Streptococcus canis*, *Streptococcus pyogenes* e *Truperella pyogenes*.

**Gatos:** infecções causadas por cepas sensíveis de *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pyogenes* e *Truperella pyogenes*.

## APRESENTAÇÕES

**Agemoxi CL<sup>®</sup> 50 mg / Agemoxi CL<sup>®</sup> 250 mg:** cartuchos com 10 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

### Cães e gatos

**Agemoxi CL<sup>®</sup> 50 mg:** 1 a 2 cp. / 4 kg / VO / a cada 12 horas ou a critério do Médico Veterinário.

**Agemoxi CL<sup>®</sup> 250 mg:** 1 a 2 cp. / 20 kg / VO / a cada 12 horas ou a critério do Médico Veterinário.



# Doxitrat<sup>®</sup>

Doxiciclina

## INDICAÇÕES

Erliquiose canina, febre maculosa (*Rickettsia rickettsii*), bartonelose, borreliose (doença de Lyme), micoplasmose (*Mycoplasma spp.*), clamidiose (*Chlamydia spp.*), infecções respiratórias, infecções genitourinárias, infecções intestinais, infecções articulares, infecções dermatológicas como feridas infectadas, pós-operatórias e otites causadas por cepas sensíveis.

## APRESENTAÇÕES

**Doxitrat<sup>®</sup> 80 mg:** cartuchos com 12 e 24 comprimidos palatáveis e bissulcados.

**Doxitrat<sup>®</sup> 200 mg:** cartucho com 24 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

### Cães e gatos

**Doxitrat<sup>®</sup> 80 mg:** 1 cp. / 8 kg / VO / a cada 24 horas ou 1 cp. / 16 kg / VO / a cada 12 horas ou a critério do Médico Veterinário.

**Doxitrat<sup>®</sup> 200 mg:** 1 cp. / 20 kg / VO / a cada 24 horas ou 1 cp. / 40 kg / VO / a cada 12 horas ou a critério do Médico Veterinário.



# Ceftrat<sup>®</sup>

Cefpodoxime

## INDICAÇÕES

Infecções causadas por cepas sensíveis de *Fusobacterium nucleatum*, *Pasteurella multocida*, *Proteus mirabilis*, *Porphyromonas gulae*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus intermedius* e *Streptococcus canis*.

## APRESENTAÇÕES

**Ceftrat<sup>®</sup> 100 mg / Ceftrat<sup>®</sup> 200 mg:** cartuchos com 12 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

### Cães

**Ceftrat<sup>®</sup> 100 mg e 200 mg - 5 a 10 mg / kg / VO / a cada 24h ou a critério do Médico Veterinário.**



### Ceftrat<sup>®</sup> 100 mg

Peso	Dose 5 mg/kg	Peso	Dose 10 mg/kg
5 kg	<input type="checkbox"/> comprimido ao dia	2,5 kg	<input type="checkbox"/> comprimido ao dia
10 kg	<input type="checkbox"/> comprimido ao dia	5 kg	<input type="checkbox"/> comprimido ao dia
15 kg	<input type="checkbox"/> comprimido ao dia	7,5 kg	<input type="checkbox"/> comprimido ao dia
20 kg	1 comprimido ao dia	10 kg	1 comprimido ao dia

### Ceftrat<sup>®</sup> 200 mg

Peso	Dose 5 mg/kg	Peso	Dose 10 mg/kg
10 kg	<input type="checkbox"/> comprimido ao dia	5 kg	<input type="checkbox"/> comprimido ao dia
20 kg	<input type="checkbox"/> comprimido ao dia	10 kg	<input type="checkbox"/> comprimido ao dia
30 kg	<input type="checkbox"/> comprimido ao dia	15 kg	<input type="checkbox"/> comprimido ao dia
40 kg	1 comprimido ao dia	20 kg	1 comprimido ao dia

# Norflagen®



Norfloxacina

## INDICAÇÕES

Infecções causadas por bactérias gram-negativas, gram-positivas, *Mycoplasma* spp. e *Chlamydia* spp. suscetíveis à norfloxacina, por exemplo: infecções entéricas, infecções dermatológicas, otites, infecções respiratórias (pneumonias) e infecções genitourinárias (cistites, prostatites, pielonefrites e infecções uterinas).

## APRESENTAÇÃO

**Norflagen® 200 mg:** cartucho com 10 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** 1 cp. / 10 a 20 kg / VO / a cada 12 horas ou a critério do Médico Veterinário.



# Zelotril®



Enrofloxacin

## INDICAÇÕES

Infecções causadas por bactérias gram-negativas, gram-positivas, micoplasmas e espiroquetas sensíveis à enrofloxacin, por exemplo: infecções entéricas, infecções dermatológicas (piodermites), otites, infecções respiratórias, infecções genitourinárias, lesões traumáticas e pós-operatório.

## APRESENTAÇÕES

**Zelotril® 50 mg / Zelotril® 150 mg:** cartuchos com 12 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos**

**Zelotril® 50 mg:** 1 cp. / 10 kg / VO / a cada 24 horas ou a critério do Médico Veterinário.

**Zelotril® 150 mg:** 1 cp. / 30 kg / VO / a cada 24 horas ou a critério do Médico Veterinário.



# Clinbacter®



Cloridrato de Clindamicina

## INDICAÇÕES

**Cães:** infecções causadas por *Fusobacterium nucleatum*, *Porphyromonas gulae*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus intermedius*, *Streptococcus canis* e *Streptococcus pyogenes*.

**Gatos:** infecções causadas por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus canis* e *Streptococcus pyogenes*.

## APRESENTAÇÕES

**Clinbacter® 75 mg / Clinbacter® 150 mg:** cartuchos com 14 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos**

**Clinbacter® 75 mg e 150 mg:** 10 mg / kg / VO / a cada 12 horas ou a critério do Médico Veterinário.



Clinbacter® 75 mg		Clinbacter® 150 mg	
Peso	Comprimido	Peso	Comprimido
2 kg	¼ ◀	3,5 kg	¼ ◀
3,5 kg	½ ◀	7,5 kg	½ ◀
5,5 kg	¾ ◀	11 kg	¾ ◀
7,5 kg	1 ⊕	15 kg	1 ⊕

# REVIPEL<sup>®</sup>



**pocket**

*Ureia, Combinação de Silicones e Óleo Mineral.*

## INDICAÇÕES

Hidratação dos calos de apoio e regiões caracteristicamente secas e mais suscetíveis à ação de fatores externos.

## APRESENTAÇÃO

**Revipel<sup>®</sup>:** bisnaga contendo 70 g.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** aplicar 1 a 2 vezes ao dia, até a melhora do quadro ou a critério do Médico Veterinário.



# DERMOGEN<sup>®</sup>



*Xampu Hidratante com Ácido Lático, Glicerina, Germe de Trigo, Queratina Hidrolisada e Lipossomas.*

## INDICAÇÕES

Xampu de uso frequente para peles normais, ressecadas e/ou com seborreia seca de grau leve, além de prevenir a ocorrência das afecções cutâneas. Pode ser utilizado antes ou durante o intervalo do tratamento com outros xampus da Linha Agener Derma.

## APRESENTAÇÕES

**Dermogen<sup>®</sup>:** frascos contendo 200 mL e 500 mL.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** banhos 1 a 2 vezes / semana ou a critério do Médico Veterinário.



# Cortishamp<sup>®</sup>



*Xampu com Hidrocortisona a 1%, Queratina Hidrolisada e Lipossomas.*

## INDICAÇÕES

Alívio do prurido e da inflamação nas dermatoses responsivas aos corticoides. Terapia adjuvante das dermatoses alérgicas de cães e gatos.

## APRESENTAÇÃO

**Cortishamp<sup>®</sup>:** frasco contendo 125 mL.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** banhos 1 vez / dia ou em dias alternados ou a critério do Médico Veterinário.





# HIDRAPET® CREME



*Creme Pós-Banho com Óleo de Macadâmia, Ceramidas e Silicones.*

## INDICAÇÕES

Creme pós-banho sem enxágue, indicado para a hidratação da pele e dos pelos de cães e gatos. Retém a umidade e mantém a hidratação, proporcionando maior flexibilidade à pele. Facilita o desembaraço na hora de pentear, evitando o estresse.

## APRESENTAÇÕES

**Hidrapet® creme:** frascos contendo 100 g e 500 g.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** após o banho, remover o excesso de água. Aplique o produto em todo o corpo do animal. Não é necessário enxaguar.



# HIDRAPET® XAMPU



*Xampu Hidratante com Fitoesfingosina, Óleo de Macadâmia, Ureia, Ácido Lático, Glicerina, Queratina Hidrolisada e Lipossomas.*

## INDICAÇÕES

Xampu com alto poder hidratante que auxilia na nutrição e reconstrução da barreira cutânea e pelos. Especialmente desenvolvido para animais com pele e pelos ressecados e/ou sensíveis. Permite o uso frequente e pode ser utilizado em banhos alternados com outros xampus da linha Agener Derma.

## APRESENTAÇÕES

**Hidrapet® xampu:** frascos contendo 200 mL e 500 mL.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** banhos 1 a 2 vezes / semana ou a critério do Médico Veterinário.



# HIDRAPET® SKIN<sub>ON</sub>



*Solução Hidratante com Ceramidas, Fitoesfingosina, Óleo de Macadâmia, Extrato de Aloe Vera, Ácidos Graxos e Colesterol.*

## INDICAÇÕES

Solução hidratante indicada para auxiliar a hidratação e restauração da barreira cutânea em cães e gatos que apresentam a pele e pelos ressecados e sensíveis.

## APRESENTAÇÃO

**Hidrapet® Skin on:** frasco borrifador com 20 mL.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** afaste os pelos e aplique 1 borrifada do produto na pele seca do animal para cada kg de peso. Repita a aplicação a cada 7 dias por, no mínimo, 4 semanas. A frequência, quantidade de produto aplicado e tempo de tratamento podem ser alterados de acordo com a necessidade e sob a orientação do Médico Veterinário.



# CLORESTEN®

Xampu com Clorexidina a 2%, Miconazol a 2,5% e Queratina Hidrolisada.

## INDICAÇÕES

Tratamento de infecções bacterianas (piodermites) e fúngicas (dermatofitose e malasseziose) sensíveis aos princípios ativos.

## APRESENTAÇÕES

**Cloresten®:** frascos contendo 200 mL e 500 mL.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

Banhos 2 vezes / semana ou a critério do Médico Veterinário.



# SEPT CLEAN®

Clorexidina 1% e Queratina Hidrolisada.

## INDICAÇÕES

Banhos pré-cirúrgicos para redução de contaminação, limpeza de regiões contaminadas, tratamento de piодermites e outras dermatoses sensíveis ao clorexidina.

## APRESENTAÇÃO

**Sept Clean®:** frasco contendo 125 mL.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

Banhos ou limpeza de regiões contaminadas. Enxaguar bem. A frequência dos banhos deverá ser realizada a critério do Médico Veterinário.



# SEBOTRAT® S

Xampu com Ácido Salicílico a 2,3%, Enxofre a 2%, Queratina Hidrolisada e Lipossomas.

## INDICAÇÕES

Controle e tratamento dos distúrbios de queratinização da pele e da seborreia seca.

## APRESENTAÇÃO

**Sebotrat® S:** frasco contendo 200 mL.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** banhos 1 a 2 vezes / semana ou a critério do Médico Veterinário. Recomenda-se a aplicação mais frequente no início do tratamento.



# SEBOTRAT® O

Xampu com Ácido Salicílico a 2%, Enxofre a 2%, Alcatrão a 4,5%, Queratina Hidrolisada e Lipossomas.

## INDICAÇÕES

Controle e tratamento dos distúrbios de queratinização e da seborreia oleosa em cães.

## APRESENTAÇÃO

**Sebotrat® O:** frasco contendo 200 mL.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães:** banhos 2 a 3 vezes / semana ou a critério do Médico Veterinário.



## DERMOGEN<sup>®</sup>OTO

Solução Otológica com Ácido Láctico, Alantoína e Extrato de Aloe Vera.

### INDICAÇÕES

Solução auricular indicada para higiene frequente e hidratação das orelhas de cães e gatos.

### APRESENTAÇÃO

**Dermogen<sup>®</sup> OTO:** frasco contendo 100 mL.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** aplicar diretamente no pavilhão auricular e no conduto auditivo dos animais, 1 a 2 vezes / semana ou a critério do Médico Veterinário.



## CLEAN-UP<sup>®</sup>

Solução Otológica com Tris-EDTA, Ácido Salicílico, Glicerina, Extrato de Aloe Vera, Óleo de Calêndula e Dioctil Sulfosuccinato de Sódio.

### INDICAÇÕES

Ideal para higiene do conduto auditivo de cães e gatos e para auxiliar no tratamento e profilaxia das otites.

### APRESENTAÇÃO

**Clean-up<sup>®</sup>:** frasco contendo 100 mL.


### POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** 1 a 2 vezes / semana para a higiene de rotina e profilaxia de otites ou a critério do Médico Veterinário.

O produto pode ser utilizado para limpeza dos condutos auditivos previamente a outros tratamentos, sem interferir em sua ação.

**NOVA  
FÓRMULA**  
com Tris-EDTA

pH fisiológico  
e não irritante.



## Otocalm<sup>®</sup>

Solução Otológica com Gentamicina, Tiabendazol, Betametasona e Cloridrato de Lidocaína.

### INDICAÇÕES

Otites externas bacterianas e fúngicas agudas e crônicas causadas por: *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Blastomyces spp.*, *Trichophyton spp.*, *Fusarium spp.* e *Monilia spp.*

### APRESENTAÇÃO

**Otocalm<sup>®</sup>:** frasco contendo 14 mL.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:**

< 15 Kg: 4 gotas / orelha / 2 vezes ao dia / 7 dias ou a critério do Médico Veterinário.

> 15 Kg: 6 gotas / orelha / 2 vezes ao dia / 7 dias ou a critério do Médico Veterinário.



## Zelotril<sup>®</sup> Oto

Emulsão Otológica com Enrofloxacina, Sulfadiazina de Prata e Hidrocortisona.

### INDICAÇÕES

Otitis externas bacterianas e fúngicas causadas por *Malassezia pachydermatis*, *Staphylococcus* spp. coagulase positivo, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter* ssp., *Proteus mirabilis*, *Streptococcus* spp., *Aeromonas hydrophila*, *Aspergillus* spp., *Klebsiella pneumoniae* e *Candida albicans*.

### APRESENTAÇÃO

Zelotril<sup>®</sup> Oto: frasco contendo 30 mL.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

#### Cães:

< 16 kg: 5 a 10 gotas / orelha / 2 vezes ao dia / 14 dias ou a critério do Médico Veterinário.  
> 16 kg: 10 a 15 gotas / orelha / 2 vezes ao dia / 14 dias ou a critério do Médico Veterinário.



## Emedron<sup>®</sup>

Cloridrato de Ondansetrona

### INDICAÇÕES

Emedron<sup>®</sup> é um medicamento utilizado na prevenção e tratamento de êmese em cães e gatos.

### APRESENTAÇÕES

Emedron<sup>®</sup> 5 mg / Emedron<sup>®</sup> 10 mg / Emedron<sup>®</sup> 20 mg: cartuchos com 10 comprimidos palatáveis e bissulcados.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

Cães e gatos: 0,5 mg a 1 mg / Kg / VO / a cada 8 horas por 5 dias consecutivos ou a critério do Médico Veterinário.



## Gaviz<sup>®</sup> V

Omeprazol

### INDICAÇÕES

Tratamento e prevenção de esofagites, úlceras e erosões do estômago e do duodeno em cães e gatos.

### APRESENTAÇÕES

Gaviz<sup>®</sup> V 10 mg / Gaviz<sup>®</sup> V 20 mg: displays com 5 strips contendo 10 comprimidos cada.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

#### Gaviz<sup>®</sup> V 10 mg

Cães e gatos: 1 cp. / 10 kg / VO / a cada 24 horas / 10 a 14 dias ou a critério do Médico Veterinário.

#### Gaviz<sup>®</sup> V 20 mg

Cães e gatos: 1 cp. / 20 kg / VO / a cada 24 horas / 10 a 14 dias ou a critério do Médico Veterinário.



# Sec Lac<sup>®</sup>



Metergolina

## INDICAÇÕES

Tratamento da pseudociese e interrupção da lactação em cadelas e gatas.

## APRESENTAÇÕES

**Sec Lac<sup>®</sup> 5 / Sec Lac<sup>®</sup> 20:** cartuchos com 16 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

### Cadelas

**Sec Lac<sup>®</sup> 5 (0,5 mg):** 1 cp. / 5 kg / VO / a cada 12 horas / 4 a 8 dias ou a critério do Médico Veterinário.

**Sec Lac<sup>®</sup> 20 (2 mg):** 1 cp. / 20 kg / VO / a cada 12 horas / 4 a 8 dias ou a critério do Médico Veterinário.

### Gatas

**Sec Lac<sup>®</sup> 5 (0,5 mg):** 1 cp. / 4 kg / VO / a cada 12 horas / 4 a 8 dias ou a critério do Médico Veterinário.



# Petpril<sup>®</sup>



Maleato de Enalapril

## INDICAÇÕES

Vasodilatador utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica e renal.

## APRESENTAÇÕES

**Petpril<sup>®</sup> 5 mg / Petpril<sup>®</sup> 10 mg:** 30 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

### Cães

**Petpril<sup>®</sup> 5 mg:** 1 cp. / 10 kg / VO / a cada 12 ou 24 horas ou a critério do Médico Veterinário.

**Petpril<sup>®</sup> 10 mg:** 1 cp. / 20 kg / VO / a cada 12 ou 24 horas ou a critério do Médico Veterinário.

### Gatos

**Petpril<sup>®</sup> 5 mg:** 1/4 a 1/2 cp. / 5 kg / VO / a cada 12 ou 24 horas ou a critério do Médico Veterinário.



# Revimax<sup>®</sup>



Propentofilina

## INDICAÇÕES

Tratamento das afecções decorrentes da má circulação periférica e cerebral, melhorando a qualidade de vida do paciente geriátrico. Aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e atua diretamente contra o processo neurodegenerativo, melhorando as funções cognitivas e reduzindo as alterações comportamentais do animal senil.

## APRESENTAÇÃO

**Revimax<sup>®</sup> 50 mg:** cartucho com 30 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães:** 3 a 5 mg / kg / VO / a cada 12 horas, durante 4 a 6 semanas ou a critério do Médico Veterinário.



# Lacri<sup>®</sup>



Colírio Lubrificante com Carboximetilcelulose Sódica.

## INDICAÇÕES

Lubrificante ocular indicado para o alívio dos sintomas da ceratoconjuntivite seca.

## APRESENTAÇÃO

**Lacri:** frasco contendo 15 mL.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães:** instilar 1 gota em cada olho afetado / 4 vezes ao dia / 7 dias consecutivos ou a critério do Médico Veterinário.



# Lacri Caps

## Pet

Luteína, Zeaxantina, Ômega 3 (EPA + DHA), Óleo de Borragem (GLA), Bilberry, Taurina, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina C e Cromo total.

### INDICAÇÕES

É um suplemento alimentar saboroso, composto por vitaminas, aminoácidos, polifenóis e ácidos graxos essenciais derivados dos peixes marinhos e óleo de borragem. É indicado para cães e gatos que necessitem da suplementação desses nutrientes. Auxilia na lubrificação e saúde ocular.

### APRESENTAÇÃO

**Lacri Caps:** 40 cápsulas moles saborosas.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** administrar a cápsula inteira ou o conteúdo da cápsula de acordo com a seguinte dose: 1 cápsula ao dia para cães e gatos de até 10 kg de peso ou a critério do Médico Veterinário.



# OMEGA TOP® 3

EPA e DHA

### INDICAÇÕES

É indicado para cães e gatos que necessitem de suplementação desses nutrientes. **Omega Top® 3** possui alta tecnologia que reduz o cheiro de peixe.

### APRESENTAÇÕES

**Omega Top® 3 500 mg / Omega Top® 3 1000 mg:** 40 cápsulas moles saborosas.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

Administrar a cápsula inteira ou o conteúdo da cápsula de acordo com a seguinte dose:

#### Cães e gatos:

**Omega Top® 3 500 mg:** 1 cápsula ao dia para cães e gatos de até 9 kg de peso ou a critério do Médico Veterinário.

**Omega Top® 3 1000 mg:** 1 cápsula ao dia para cães e gatos de até 18 kg de peso ou a critério do Médico Veterinário.



# HIDRAPET®

## ÔMEGA

Biotina, Ômegas 3 e 6, Vitaminas e Zinco Quelatado.

### INDICAÇÕES

É um suplemento alimentar vitamínico saboroso composto por ácidos graxos essenciais e vitaminas. É indicado para cães e gatos, auxiliando na redução de queda de pelos, na melhora do brilho e na saúde da pele e pelagem.

### APRESENTAÇÃO

**Hidrapet® ômega:** 60 cápsulas moles saborosas.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** administrar a cápsula inteira ou o conteúdo da cápsula de acordo com a seguinte dose: 1 cápsula ao dia para cães e gatos de até 10 kg de peso ou a critério do Médico Veterinário.



**PRO**  
**cart**<sup>®</sup>  
1.000 mg

**PRO**  
**cart**<sup>®</sup> 25  
2.100 mg



Condroitina, Glicosamina, Extrato de Yucca e Minerais Quelatados.

#### INDICAÇÕES

Suplemento que contém glicosaminoglicanos, extrato vegetal e minerais quelatados, indicado como auxiliar na melhoria das condições nutricionais e na suplementação de animais com intensa atividade física. Os glicosaminoglicanos, condroitina e glicosamina são precursores fundamentais na estruturação e fortalecimento das articulações de cães e gatos.

#### APRESENTAÇÕES

**Procart<sup>®</sup> 1.000 / Procart<sup>®</sup> 2.100:** 60 comprimidos saborosos e sulcados.

#### POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:**

**Procart<sup>®</sup> 1.000 mg:** 1 comprimido para cada 10 kg de peso 1 vez ao dia ou a critério do Médico Veterinário.

**Procart<sup>®</sup> 2.100 mg:** 1 comprimido para cada 25 kg de peso 1 vez ao dia ou a critério do Médico Veterinário.

1x  
ao dia

10 kg

PRO-CART <sup>®</sup> 1.000 MG NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO (MÍNIMO)	
Descrição	Por comprimido
SULFATO DE CONDRITINA A	244,450 mg
SULFATO DE GLUCOSAMINA	255,100 mg
EXTRATO DE YUCCA	1,200 mg
MANGANÊS QUELATADO	3,525 mg
MAGNÉSIO QUELATADO	4,000 mg
GLICINATO DE COBRE	13,500 mg
ZINCO QUELATADO	7,000 mg

1x  
ao dia

25 kg

PRO-CART <sup>®</sup> 2.100 MG NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO (MÍNIMO)	
Descrição	Por comprimido
SULFATO DE CONDRITINA A	642,278 mg
SULFATO DE GLUCOSAMINA	846,294 mg
EXTRATO DE YUCCA	3,000 mg
MANGANÊS QUELATADO	8,812 mg
MAGNÉSIO QUELATADO	10,000 mg
GLICINATO DE COBRE	33,750 mg
ZINCO QUELATADO	17,500 mg

1,5 EPA : 1 DHA



1x  
ao dia

INDEPENDENTE DO PESO

**PRO**  
**cart**<sup>®</sup>  
FLEX



Colágeno Tipo II Não Desnaturado (UC-II<sup>®</sup>), Curcumina Phospholipid (Curcuvet<sup>®</sup>), Ômega 3 (EPA+DHA), Zinco Quelatado, Glicinato de Cobre, Magnésio Quelatado e Selênio Quelatado.

#### INDICAÇÕES

É um suplemento alimentar saboroso composto pelo exclusivo colágeno tipo II não desnaturado (UC-II<sup>®</sup>) de fabricação patenteada, possui também em sua formulação a curcumina phospholipid (Curcuvet<sup>®</sup>), que facilita sua absorção, ômega 3 (EPA+DHA nas proporções ideais) e minerais quelatados. É indicado para cães e gatos que necessitem de suplementação desses nutrientes.

#### ÚNICA APRESENTAÇÃO

**Procart<sup>®</sup> Flex:** 40 cápsulas moles saborosas.

#### POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** administrar 1 cápsula, independente do peso do animal, 1 vez ao dia ou a critério do Médico Veterinário.

#### NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO (MÍNIMO):

Descrição	Por cápsula	Por kg de produto
COLÁGENO TIPO II NÃO DESNATURADO (UC-II <sup>®</sup> )	40,00 mg	40 g
CURCUMINA PHOSPHOLIPID (CURCUVET <sup>®</sup> )	75,00 mg	75 g
ÔMEGA 3 (EPA + DHA)	299,75 mg	299,75 g
EPA (ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO)	179,85 mg	179,85 g
DHA (ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO)	119,90 mg	119,90 g
ZINCO QUELATADO	3,50 mg	3,50 g
GLICINATO DE COBRE	6,50 mg	6,50 g
MAGNÉSIO QUELATADO	2,00 mg	2,00 g
SELÊNIO QUELATADO	0,35 mg	0,35 g

**MegaMater**<sup>®</sup>  
Pet



Ácido Fólico (L-Metilfolato), Ômega 3 (EPA +DHA), Vitamina A, Vitamina E, Vitamina C, Vitamina B12, Ferro, Zinco Quelatado, Selênio Quelatado.

#### INDICAÇÕES

É um suplemento alimentar saboroso composto por ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais quelatados. É indicado para suplementação de fêmeas gestantes e lactantes.

#### ÚNICA APRESENTAÇÃO

**Mega Mater<sup>®</sup>:** 60 cápsulas moles saborosas.

#### POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cadelas e gatas:** administrar a cápsula inteira ou o conteúdo da cápsula de acordo com a seguinte dose: 1 cápsula ao dia para cadelas e gatas de até 10 kg de peso ou a critério do Médico Veterinário.



DHA 5 : 1 de EPA

# Hysteril

**Desinfetante**  
ALTO PODER GERMICIDA



Desinfetante concentrado com Cloreto de Benzalcônio 20%.

## INDICAÇÕES

Ideal para desinfecção de consultórios, centros cirúrgicos, canis e gatis, banho e tosa, caixas de transporte e quintais.

## APRESENTAÇÃO

**Hysteril®:** frasco contendo 1 L.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

Diluir 25 mL de Hysteril® em 10 litros de água.

**Ambientes:** antes de aplicar o produto, lavar as instalações e utensílios que serão desinfetados; deixar o produto agir por 15 minutos após a aplicação. Não há necessidade de remover o produto.



## ANALGÉSICO

# Cronidor® 2%



Cloridrato de Tramadol

## INDICAÇÕES

Analgésico opioide indicado para o alívio da dor de grau moderado para cães e gatos.

## APRESENTAÇÃO

**Cronidor® 2%:** frasco-ampola contendo 20 mL de cloridrato de tramadol 2%.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães:** 1 mL / 10 kg / IM / a cada 6 horas / 4 dias ou a critério do Médico Veterinário.

**Gatos:** 1 mL / 10 kg / IM / a cada 8 horas / 4 dias ou a critério do Médico Veterinário.



USO EXCLUSIVO EM CLÍNICAS VETERINÁRIAS.

## ANTI-INFLAMATÓRIO

# Flamavet® 0,2 %



Meloxicam

## INDICAÇÕES

Anti-inflamatório, analgésico e antitérmico para cães e gatos.

## APRESENTAÇÃO

**Flamavet® 0,2%:** frasco-ampola contendo 20 mL de meloxicam 0,2%.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães:** no primeiro dia 1 mL / 10 kg / IV ou SC / a cada 24 horas; a partir do segundo dia 1 mL / 20 kg / IV ou SC / a cada 24 horas por até 7 dias ou a critério do Médico Veterinário.

**Gatos:** no primeiro dia 1 mL / 20 kg / SC / a cada 24 horas; a partir do segundo dia 1 mL / 40 kg / SC / a cada 24 horas por até 4 dias ou a critério do Médico Veterinário.



USO EXCLUSIVO EM CLÍNICAS VETERINÁRIAS.



## ANESTÉSICO

# Ketamina Agener 10%



Cloridrato de Cetamina

## INDICAÇÕES

Agente anestésico dissociativo para intervenções cirúrgicas, contenções químicas e indução anestésica em cães e gatos.

## APRESENTAÇÃO

**Ketamina Agener 10% (100 mg / mL):** frasco-ampola contendo 50 mL de cloridrato de cetamina a 10%.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** 0,02 a 0,05 mL / kg / IV ou 0,05 a 0,2 mL / kg / IM ou a critério do Médico Veterinário.



USO EXCLUSIVO EM CLÍNICAS VETERINÁRIAS.

## ANTIEMÉTICO

# Emedron® 1%



Cloridrato de Ondansetrona

## INDICAÇÕES

Medicação injetável antiemética para cães e gatos.

## APRESENTAÇÃO

**Emedron® 1%:** frasco-ampola contendo 10 mL de cloridrato de ondansetrona di-hidratado 12,5 mg, equivalente a 10 mg de ondansetrona base.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães:** 1 mL / 20 kg / IV / a cada 8 horas. Aplicação em no mínimo 3 minutos\*.

**Gatos:** 1 mL / 20 kg / IV / a cada 8 horas. Aplicação em no mínimo 1 minuto\*.

(\* ) Recomenda-se a administração acrescida de solução fisiológica a 0,9%.

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro e a remissão dos sintomas, ou a critério do Médico Veterinário.



Desenvolvida para uso em cães pequenos e gatos:

0,15 mL	▶▶▶	3 kg
0,25 mL	▶▶▶▶	5 kg
0,5 mL	▶▶▶▶▶	10 kg

Ideal também para cães de médio a grande porte:

1 mL	▶▶▶▶▶▶	20 kg
2 mL	▶▶▶▶▶▶▶	40 kg
3 mL	▶▶▶▶▶▶▶▶	60 kg

USO EXCLUSIVO EM CLÍNICAS VETERINÁRIAS.

## BIOLÓGICOS

# Providean® VIRATEC 10 CVL

## INDICAÇÕES

Vacina contra cinomose, parvovirose, hepatite infecciosa e doença respiratória causada pelo adenovírus tipo 2, parainfluenza, coronavírus e leptospirose canina.

## APRESENTAÇÃO

**Providean® Viratec 10 CVL:** caixa contendo 25 frascos com uma dose liofilizada (antígenos atenuados) contra parvovírus canino, cinomose, adenovírus canino Tipo 2 e parainfluenza canina + 25 frascos de 1 mL de fração líquida (antígenos inativados) contra coronavírus e leptospiros (*L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. grippotyphosa* e *L. pomona*).

## ESQUEMA DE VACINAÇÃO SUGERIDO

Indicado para cães saudáveis a partir de 6 semanas de idade. Após a reconstituição da fração liofilizada com a fração líquida, administrar todo o conteúdo por via subcutânea ou intramuscular. **O esquema de vacinação deve ser adaptado sob orientação do Médico Veterinário de acordo as condições específicas de cada animal, região e/ou ambiente.**



VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

# Helfine<sup>®</sup> Plus Cães

Praziquantel, Pirantel e Febantel.

## INDICAÇÕES

Tratamento e controle das verminoses gastrointestinais causadas por cestódeos, nematódeos e protozoário (*Giardia* spp).

## APRESENTAÇÃO

**Helfine<sup>®</sup> Plus Cães:** cartucho com 4 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães:** 1 cp. / 10 kg / VO / dose única. É recomendável repetir após 15 dias ou a critério do Médico Veterinário.

**Giardíase:** 1 cp. / 10 kg / VO / a cada 24 horas, durante 3 dias ou a critério do Médico Veterinário.



# Fenzol<sup>®</sup> Pet

Fembendazol

## INDICAÇÕES

Tratamento e controle das verminoses gastrointestinais dos cães, causadas por nematódeos, além de ser o agente de escolha para o tratamento e controle das infecções causadas por giárdia.

## APRESENTAÇÃO

**Fenzol Pet<sup>®</sup> 500 mg:** cartucho com 6 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães:** 1 cp. / 10 kg / VO / a cada 24 horas / 3 dias ou a critério do Médico Veterinário.



# Mectimax<sup>®</sup>

Ivermectina

## INDICAÇÕES

Em cães é indicado no tratamento de infestações por vermes, carrapatos, sarna demodécica, sarna sarcóptica e sarna otodécica em cães.

Em gatos é indicado no tratamento da sarna otodécica.

## APRESENTAÇÕES

**Mectimax<sup>®</sup> 3 mg / Mectimax<sup>®</sup> 12 mg:** displays com 16 blisters contendo 4 comprimidos palatáveis e bissulcados.

**Mectimax<sup>®</sup> 3 mg / Mectimax<sup>®</sup> 12 mg:** cartucho com 4 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães:**

**Carrapatos, vermes, sarna sarcóptica e otodécica\*:**

0,2 mg / Kg / VO / 2 doses com intervalo de 7 dias ou a critério do Médico Veterinário.

**Sarna demodécica:** 0,6 mg / Kg / VO / a cada 24 horas,

durante 60 dias ou a critério do Médico Veterinário.

**Gatos:**

**Sarna otodécica\*\*:** 0,3 mg / Kg / VO / 2 doses com intervalo de 7 dias ou a critério do Médico Veterinário.



Eficácia contra carrapatos por até 35 dias após a segunda administração.

Único comprimido oral contra sarna otodécica em gatos com apenas 2 doses.

### PARA CÃES (3 EM 1)

		Mectimax <sup>®</sup>	
		3 mg	12 mg
		Comprimido	Peso
Cães	¼	↖	3,75 kg / 15 kg
	½	↗	7,5 kg / 30 kg
Cães	¾	↘	11,25 kg / 45 kg
	1	↙	15 kg / 60 kg

\*Doses contra carrapato, vermes e sarnas

### PARA GATOS

		Mectimax <sup>®</sup>	
		3 mg	
		Comprimido	Peso
Gatos	¼	↖	2,5 kg
	½	↗	5 kg
Gatos	¾	↘	7,5 kg
	1	↙	10 kg

\*\* Doses contra sarna otodécica

# Ball Free®

Vitaminas, Aminoácidos, Lecitina de Soja e Extrato de Malte.

## INDICAÇÕES

Suplemento alimentar que favorece a eliminação de bolas de pelo, à base de extrato de malte, lecitina de soja, vitaminas e aminoácidos. O extrato de malte e a lecitina de soja favorecem a eliminação de bolas de pelo naturalmente através das fezes.

## APRESENTAÇÃO

**Ball Free®**: bisnaga contendo 70 g.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Gatos**: inicialmente, administrar 2 cm de Ball Free®, uma vez ao dia, diretamente na boca do animal ou sobre suas patas dianteiras, durante 15 dias. Após este período, administrar 2 cm, uma vez por semana ou a critério do Médico Veterinário.



# Mirtz® 2 mg

Mirtazapina

## INDICAÇÕES

Indicado para gatos que apresentam hiporexia ou anorexia (falta de apetite), como estimulante de apetite e de ganho de peso.

## APRESENTAÇÃO

**MIRTZ® 2 mg**: cartucho com 12 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Gatos**:

1 cp. / por gato / VO / a cada 48 horas / por até 3 semanas ou a critério do Médico Veterinário.



# Helfine® Plus Gatos

Praziquantel e Pirantel

## INDICAÇÕES

Tratamento e controle das verminoses gastrointestinais causadas por cestódeos e nematódeos.

## APRESENTAÇÃO

**Helfine Plus Gatos®**: cartucho com 2 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Gatos**: 1 cp. / 4 kg / VO / dose única. É recomendável repetir após 15 dias ou a critério do Médico Veterinário.



# Flamavet® 0,2 mg

Meloxicam

## INDICAÇÕES

Anti-inflamatório não esterooidal COX-2 seletivo e analgésico para gatos.

## APRESENTAÇÕES

**Flamavet® 0,2 mg**: display com 5 blísteres contendo 10 comprimidos palatáveis e bissulcados ou cartucho com 10 comprimidos palatáveis e bissulcados.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Gatos**: no primeiro dia 0,1 mg / kg / VO / a cada 24 horas; a partir do segundo dia 0,05 mg / VO / a cada 24 horas / por até 21 dias ou a critério do Médico Veterinário.



# ANTIPARASITÁRIOS

## ECTOCID®

CONTRA PULGAS E CARRAPATOS

Fipronil 13%

### INDICAÇÕES

Indicado para tratamento e controle de infestações causadas por pulgas (*Ctenocephalides felis felis*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) em cães.

### APRESENTAÇÃO

**ECTOCID®:** pipetas plásticas, contendo 0,67 mL, 1,34 mL, 2,68 mL e 4,02 mL.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães:** deve ser administrado exclusivamente pela via tópica (spot on) em administração única, conforme a tabela ao lado\*:



Espécie	Faixa de peso	Dosagem	Via de administração
Cães	Até 10 kg	Uma pipeta de 0,67 mL	Tópica (spot on)
	De 10 a 20 kg	Uma pipeta de 1,34 mL	Tópica (spot on)
	De 20 a 40 kg	Uma pipeta de 2,68 mL	Tópica (spot on)
	Acima de 40 kg	Uma pipeta de 4,02 mL	Tópica (spot on)

\*ou a critério do Médico Veterinário.

## SUPLEMENTOS

# QPelo®

Biotina, Cistina, Extrato de Leveduras, Vitaminas e Minerais Quelatados.

*Biotina, Cistina, Extrato de Leveduras, Vitaminas e Minerais Quelatados.*

### INDICAÇÕES

Indicado para o fortalecimento da pelagem, auxílio no combate à queda, crescimento e nutrição para os pelos de dentro para fora.

### APRESENTAÇÃO

**QPelo:** frasco, contendo 40 comprimidos bissulcados.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** administrar 1 comprimido ao dia, para cães e gatos com até 10 kg de peso ou a critério do Médico Veterinário.



## DERMATOLÓGICOS

# SEPT CLEAN® OTO

Solução otológica com Tris-EDTA e Clorexidine 0,15%

### INDICAÇÕES:

Higiene dos condutos auditivos de cães e gatos, facilitando a remoção do cerúmen e secreções, controlando o odor. Pode ser utilizado antes de administrar agentes terapêuticos.

### APRESENTAÇÃO


**Sept Clean Oto:** frasco, contendo 100 mL.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Cães e gatos:** a cada 12 ou 24 horas, por pelo menos 14 dias ou sob orientação do Médico Veterinário. Para animais predispostos à otite, pode ser utilizado uma ou duas vezes por semana por tempo indeterminado.



 tris-EDTA  
 clorexidina 0,15%  
 pH fisiológico



# Providean® VIRATEC DP

## INDICAÇÕES

Indicada para o início da vacinação em filhotes de cães, a partir de 4 semanas de vida como auxiliar na prevenção da parvovirose e cinomose.

## APRESENTAÇÃO

**PROVIDEAN VIRATEC® DP:** caixa contendo 5 frascos com fração liofilizada (antígenos atenuados) contra parvovirus canino e vírus da cinomose canina; acompanhados de 5 frascos de 0,5 mL de fração líquida (diluente estéril).

## ESQUEMA DE VACINAÇÃO SUGERIDO

Em cães a partir de 4 semanas de vida, recomenda-se um programa de vacinação com no mínimo três doses, mantendo um intervalo de 2 a 4 semanas entre cada uma, até as 16 semanas de vida ou mais.



VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

# Providean® VIRATEC 6 CV

## INDICAÇÕES

Vacina contra cinomose canina, parvovirose, hepatite infecciosa canina, doença respiratória causada pelo adenovírus tipo 2 e parainfluenza e coronavírus canina.

## APRESENTAÇÃO

**PROVIDEAN VIRATEC® 6 CV:** caixa contendo 25 frascos com fração liofilizada (antígenos atenuados) contra parvovirus canino, vírus da cinomose canina, adenovírus canino tipo 2 e parainfluenza canina; acompanhados de 25 frascos de 1ml de fração líquida (antígenos inativados) contra coronavírus.

## ESQUEMA DE VACINAÇÃO SUGERIDO

Em cães a partir das 6 semanas de vida, recomenda-se um programa de vacinação com no mínimo três doses, mantendo um intervalo de 3 a 4 semanas entre cada uma, até as 16 semanas de vida ou mais. O esquema de vacinação deve ser adaptado a critério do Médico Veterinário de acordo com as condições específicas de cada animal, região e/ou ambiente.



VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.



Unidade de Taboão da Serra (SP)



Unidade de biotecnologia, Bthek Brasília (DF)



Unidade de Embu-Guaçu (SP)



Centro Logístico e Pq. Gráfico Pouso Alegre (MG)



Unidade de Pouso Alegre (MG)



Unidade de Guarulhos (SP)



Unidade de São Paulo (SP)



Unidade Laboratíl (SP)



Unidade de Augusta, Geórgia (EUA)  
União Agener



Unidade de Brasília (DF)

## UNIÃO QUÍMICA E AGENER

### TRADIÇÃO E QUALIDADE NO COMPROMISSO COM A SAÚDE!

A União Química Farmacêutica Nacional S/A é uma empresa brasileira com 87 anos de história no mercado farmacêutico e adota as melhores práticas de produção. Investe continuamente na modernização e desenvolvimento tecnológico de suas unidades fabris, atendendo com excelência às normas nacionais e internacionais de produção de medicamentos. Seu polo industrial é composto por nove unidades fabris no Brasil e uma unidade nos EUA.

**A Agener é a Divisão Veterinária deste grupo e há 24 anos atua em três segmentos de Saúde Animal.**

**Linha Pet:** ampla linha de produtos para prevenção, imunização e tratamento de doenças de cães e gatos. A Linha Agener é referência na prescrição do Médico Veterinário de pequenos animais e entrega soluções para a rotina clínica, cirúrgica e intervenção de seus pacientes. Conta também com amplo portfólio de suplementos que contribuem com a saúde, bem-estar e longevidade dos animais de estimação.

**Linha Animais de Produção:** amplo e completo portfólio para a sanidade, garantindo uma produção cada vez mais sustentável.

**Linha Reprodutiva Tecnopec:** produtos de biotecnologia para a reprodução animal.

A missão da Agener é produzir, desenvolver e fornecer produtos de qualidade que contribuam para o bem-estar e saúde dos animais.

Siga  [agener.oficial](https://www.instagram.com/agener.oficial)  
[www.agener.com.br](http://www.agener.com.br) - SAC: 0800 701 1799



Consulte sempre um Médico Veterinário.  
Material dirigido direto e unicamente a profissionais Médicos Veterinários e equipe de vendas.